Окислительно-восстановительные реакции

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР) – это реакции, протекающие с изменением степени окисления атомов, входящих в состав реагирующих веществ. В ОВР происходит переход электронов от одних атомов, молекул или ионов к другим.

Степень окисления – условный заряд атома в молекуле, вычисленный в предположении, что она состоит из ионов. При расчете степени окисления исходят из электронейтральности молекул: сумма всех степеней окисления атомов в соединении равна нулю.

Процесс отдачи электронов атомом, молекулой или ионом называется **окислением**.

Процесс присоединения электронов атомом, молекулой или ионом называется **восстановлением**.

Атомы, ионы, молекулы, отдающие электроны – восстановители (сами окисляются).

Атомы, ионы, молекулы, принимающие электроны – окислители (сами восстанавливаются).

Окисление всегда сопряжено с восстановлением. Число электронов, участвующих в процессе окисления равно числу электронов, участвующих в процессе восстановления.

ОКИСЛИТЕЛИ	ВОССТАНОВИТЕЛИ
1. Атомы элементов VI – VII групп (O_2 , Cl_2)	1. Атомы всех металлов.
2. Ионы металлов в высоких степенях окисления (Fe^{3+} , Cu^{2+})	2. Отрицательно заряженные ионы неметаллов (S^{2-} , Cl^- , Br^-)
3. Ионы, молекулы, содержащие атомы металлов в высоких степенях окисления ($\text{KMn}^{+7}\text{O}_4$, $\text{K}_2\text{Cr}_2^{+6}\text{O}_7$)	3. Ионы металлов в низких степенях окисления (Fe^{2+} , Mn^{2+})
4. Ионы, молекулы, содержащие атомы неметаллов в высоких степенях окисления (HN^{+5}O_3 , $\text{H}_2\text{S}^{+6}\text{O}_4$, $\text{KCl}^{+5}\text{O}_3$)	4. Ионы и молекулы, содержащие атомы в промежуточных степенях окисления (S^{+4}O_3)
	5. H_2 , CO

Окислителем или восстановителем в зависимости от конкретных условий могут выступать:

а) ионы металлов и неметаллов в промежуточной степени окисления.

Например:

б) элементы главных подгрупп IV и V групп периодической системы элементов.

Например:

Подбор стехиометрических коэффициентов в ОВР можно проводить **методом электронного баланса** или **методом полуреакций**:

Метод электронного баланса	Метод электронно-ионного баланса (полуреакций, - в растворах)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Найти окислитель и восстановитель 2. Записать полуреакции окисления и восстановления 3. Сбалансировать заряды 4. Суммировать полуреакции в полное электронное уравнение (электроны сокращаются) 5. Найти коэффициенты* 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Найти окислитель и восстановитель 2. Определить, какие ионы действительно существуют 3. Записать полуреакции окисления и восстановления 4. Сбалансировать число атомов в каждой, добавляя: H^+ или H_2O – в кислой среде OH^- или H_2O – в щелочной 5. Уравнять количество электронов (зарядов) 6. Суммировать полуреакции в полное электронно-ионное уравнение (электроны сокращаются) 7. Найти коэффициенты

*Следует обратить особое внимание, что стехиометрические коэффициенты должны быть получены из уравнений электронного баланса.

Влияние среды на восстановление некоторых окислителей

KMnO_4 в щелочной среде восстанавливается до **MnO_4^{2-}** (зеленый раствор);
(фиолетовый цвет раствора)

в нейтральной среде - до **MnO_2** ↓ (бурый осадок);
в кислой среде - до **Mn^{2+}** (бесцветный раствор).

Классификация ОВР

1. **Межмолекулярного окисления-восстановления** – атом-окислитель и атом-восстановитель принадлежат разным веществам.

Уравнивание проводим методом электронного баланса:

К этому же типу можно отнести и реакции межатомного и атомно-молекулярного окисления-восстановления:

2. Реакции **внутримолекулярного окисления-восстановления** – атом-окислитель и атом-восстановитель входят в состав одной молекулы или иона и могут быть представлены как разными элементами, так и одним элементом, но в разных степенях окисления:

3. Реакции **диспропорционирования** (самоокисления-самовосстановления, дисмутации) – функцию окислителя и восстановителя выполняет один и тот же атом, находящийся в промежуточной степени окисления:

Уравнивание ОВР с использованием дробных степеней окисления

Дробная степень окисления элемента свидетельствует о том, что атомы одного и того же элемента в молекуле находятся в разных степенях окисления, либо вещество представляет собой смесь веществ, в которых элемент находится в разных степенях окисления.

Однако эти реакции можно уравнивать и иным путем, если представить Mn_3O_4 как смесь MnO_2 и 2MnO :